

登録No. S-065
 登録名 FP療法(800/80)
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 食道癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 100mL/body		d1	C.V.	30min	5-FUの前投薬
Rp.2	5-FU ソルアセトD	800mg/m ² 500mL/body		d1~d5	C.V.	15時~15時 24時間持続	
Rp.3	KN3号	500mL/body		d1~d5	C.V.	2hr	
Rp.4	KN3号	500mL/body		d1~d3	C.V.	2hr	
Rp.5	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d2	C.V.	30min	アプレピタント併用
Rp.6	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500mL/body		d2	C.V.	2hr	
Rp.7	マンニトール	300mL/body		d2	C.V.	1hr	
Rp.8	ラクテック	1000mL/body		d2	C.V.	4hr	

1クールの間 4週間
 その他（副作用・PS規定等）

副作用： 血液毒性、腎障害、神経障害、アレルギーなど
 嘔気・嘔吐予防としてアプレピタントを併用すること。