

登録No. S-089  
 登録名 Weekly Abraxane療法  
 催吐性リスク 軽度  
 適応疾患 胃癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	
Rp.2	生食	100mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	nab-パクリタキセル前後フラッシュ用
Rp.3	nab-パクリタキセル 生食	100mg/m <sup>2</sup> 50mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	インラインフィルター使用禁 粘調度高いため、輸液総量の 1.5倍量をDrip-eyeに設定

1クールの間 4週間  
 その他（副作用・PS規定等）

副作用： 骨髄抑制 投与前採血でNeutr 1000/mm<sup>3</sup>未満 or Plt 75000/mm<sup>3</sup>未満で投与延期  
 投与後 Neutr 500/mm<sup>3</sup>未満 or Plt 25000/mm<sup>3</sup>未満 or  
 発熱性好中球減少症で次回減量  
 末梢神経障害 Grade3以上で投与延期してGrade2に回復後減量して再開  
 脱毛  
 アナフィラキシー  
 間質性肺炎  
 関節痛および筋肉痛

注意： 生食で希釈はしないこと。空のボトルに懸濁液を注入して投与。