

登録No. S-050
 登録名 XELOX療法
 催吐性リスク 中等度
 適応疾患 結腸・直腸癌・胃癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考	
Rp.1	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100mL/body 9.9mg/body	d1	d.i.v.	30min		
Rp.2	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body	d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン前 末梢神経障害予防	
Rp.3	オキサリプラチン 5%糖液	130mg/m ² 250mL/body	d1	d.i.v.	2hr	血管痛あればデキサメタゾン 1.65mg混注	
Rp.4	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body	d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン後	
Rp.5	カペシタビン	BSA1.36m ² 未満	d1夕～ d15朝	p.o.	分2朝夕	副作用による減量規定あり。 14日投与7日休薬	
		1.36m ² 以上1.66m ² 未満					3000mg/body/day
		1.66m ² 以上1.96m ² 未満					3600mg/body/day
		1.96m ² 以上					4200mg/body/day

1クルルの期間 3週間
 その他（副作用・PS規定等）

副作用：末梢神経障害、しびれ、骨髄抑制、消化器症状、Hand-Foot syndrome
 好中球1500以上・血小板7.5万以上で投与可。（減量規定参照）