

登録No. S-069
 登録名 SIRB療法
 催吐性リスク 中等度+オプション
 適応疾患 結腸・直腸癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	S-1	80~120mg/body/day	120mg/body	d1~14	p.o.	分2朝夕食後	2週投与1週休薬
Rp.2	ペバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL/body		d1	d.i.v.	初回90min (忍容性良好なら 2回目60min 忍容性良好なら 3回目以降 30min でも可。)	
Rp.3	グラニセトロン ^{パッ} グ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.4	イリノテカン 生食	150mg/m ² 500mL/body		d1	d.i.v.	90min	

1クールの間 3週間
 その他（副作用・PS規定等）

副作用： 好中球減少、食欲不振、下痢
 PS： 0~1
 CCr： 50mL/min以上(50mL/min ≤ CCr ≤ 80mL/minの時、1段階減量して開始)
 S-1： 1.25m²未満 → 80mg/day
 1.25m²以上1.50m²未満 → 100mg/day
 1.5m²以上 → 120mg/day