

登録No. U-027
 登録名 GCarbo療法(CBDCA肝動注併用)
 催吐性リスク 中等度
 適応疾患 尿路上皮癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	
Rp.2	ゲムシタピン 5%ブドウ糖液	800mg/m ² 100mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	
Rp.3	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.4	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d2	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.5	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.6	カルボプラチン 生食	AUC2 500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	肝動注と同時に開始
Rp.7	ハパリンNa ⁺ 用注射液	1筒/body		d2	動注		肝動注ポート前後フラッシュ用
Rp.8	カルボプラチン	AUC2		d2	動脈内 持続注入	2hr	肝動注ポートから投与 末梢のカルボプラチンと同時に開始 原液 シリンジポンプ使用
Rp.9	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.10	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.11	アクチット	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.12	生食	500mL/body		d2・3・4	d.i.v.	2hr	
Rp.13	アクチット	500mL/body		d3	d.i.v.	2hr	
Rp.14	生食	500mL/body		d3・4	d.i.v.	2hr	

1クールの間 4週間
 その他 (副作用・PS規定等)

d2よりアプレピタント内服
 副作用：貧血・血小板減少・白血球減少・肝機能障害・吐き気・脱毛
 開始基準：WBC \geq 3500/mm³、Neutr \geq 1500/mm³、Plt \geq 10万/mm³、CCr $<$ 60mL/min