

登録No. S-043
 登録名 FEC100療法
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 乳癌
 投与スケジュール

| | 薬剤 | 投与量 | 最大投与量 | 投与日 | 投与経路 | 投与時間 | 備考 |
|------|------------------------|--|-------|-----|--------|-------|------------|
| Rp.1 | パロノセトロンバッグ デキサメタゾン | 50mL/body 9.9mg/body | | d1 | d.i.v. | 30min | アプレピタント併用 |
| Rp.2 | エピルビシン 注射用蒸留水 生食 | 100mg/m ² 20mL/body 30mL/body | | d1 | d.i.v. | 全開 | 蒸留水20mLで溶解 |
| Rp.3 | シクロフォスファミド 生食 | 500mg/m ² 250mL/body | | d1 | d.i.v. | 60min | |
| Rp.4 | 5-FU 生食 | 500mg/m ² 100mL/body | | d1 | d.i.v. | 30min | |

1クールの間 3週間
 その他（副作用・PS規定等）

好中球<1000 又は 血小板10万以下 → 1週間以上延期
 骨髄抑制からの回復に3週間以上要する → 中止
 エピルビシン総投与量900mg/m²を超えないこと。
 フィルター使用禁止